




Informatie van uw tandarts

Wisselen melkgebit





Het melkgebit wisselen

Het veranderen van tanden en kiezen.

Een kind wisselt zijn tanden gemiddeld tussen zijn zesde en twaalfde jaar. Op de plaats van de melktanden en kiezen komen blijvende tanden en kiezen. Bij het wisselen duwt de blijvende tand of kies tegen de wortel van de melktand of melkkies aan. Daarbij wordt een stof aangemaakt die de wortel van de melktand of kies langzaam oplost. Hierdoor valt een melktand of kies er tenslotte (makkelijk) uit.



Kijk rond de leeftijd van vijf á zes jaar regelmatig in de mond of de blijvende kiezen al doorkomen (deze komen achter de melkkiezen door).
Poets deze kiezen vervolgens meteen goed!



Scheef doorkomen

De eerste blijvende tanden en kiezen komen soms scheef door, omdat er weinig ruimte is in de kaak. Wanneer er meer ruimte ontstaat gaan de tanden en kiezen meestal vanzelf recht(er) staan. In sommige gevallen is een beugel nodig.

Doorkomen achter melkgebit

Soms komen blijvende tanden door, wanneer de melktanden er nog zitten. Hierdoor ontstaat een dubbele rij. Dit lost zich vaak na korte tijd vanzelf op. Gebeurt dit niet of twijfelt u? Raadpleeg uw tandarts!

Bijzonderheden bij het wisselen

Afwijkende doorbraaktijden


Wanneer uw kind van acht jaar nog niet wisselt of er meer dan zes maanden verschil zit tussen het wisselen van tanden en kiezen aan de linker- en rechterkant, is het verstandig om de tandarts te informeren. Nadat een melktand er vroegtijdig uit is gegaan, kan het zijn dat de blijvende tand later doorkomt dan de normale doorbraaktijd.

Pijn

Blijf bij een 'wiebeltand' de tand voorzichtig poetsen. Een (kinder) paracetamol kan de pijn verlichten. Raadpleeg bij aanhoudende pijn de tandarts.



De gemiddelde doorbraaktijd van een melkgebit



-  6- 8 maanden
-  8- 12 maanden
-  14- 16 maanden
-  17- 19 maanden
-  23- 30 maanden

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw tandarts.

